

กรณีฉุกเฉินที่มีพิกัดติดอยู่

1. แผลถูกแทง ป้องต๋อย ตะขาบ และแมงมุมกัด
การปฐมพยาบาลปฏิบัติได้ดังนี้
 - ถ้าถูกกัดหรือต๋อยบริเวณข้อมือหรือข้อเท้า ให้ใช้ผ้าหรือสายยางรัดตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นแขนหรือขาให้รัดเหนือแผลประมาณ 5 นาที จึงคลายออก
 - ดูดเอาพิษออก หรืออาจใช้เหล็กเผาไฟจี้ใส่แผล หรืออาจผ่าแผลให้กว้าง แล้วใช้เกลือล้างทำความสะอาด
 - ใช้น้ำแข็งวางบริเวณที่ถูกกัดหรือต๋อย ประมาณ 2 ชั่วโมง แขนหรือขาข้างที่ถูกกัดหรือต๋อย ควรจะวางต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
 - บริเวณที่ถูกกัดให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
 - ถ้ามีเหล็กในติดอยู่ให้รีบออกแล้วทาวด้วยแอลกอฮอล์ โขดไปศัลยกรรม น้ำเกลือหรือน้ำปูนใส
2. แผลจากผึ้ง แตน ต่อ และแมลงกัดต่อย
การปฐมพยาบาล ปฏิบัติได้ดังนี้
 - ให้รีบเอาเหล็กในออกจากแผลทันที โดยใช้ลูกกอล์ฟยางชนิดที่มีรูตรงปลายกลดลงที่ตรงแผลนั้น เหล็กในจะไหลออกมาซึ่งสามารถดึงออกได้
 - ใช้สำลีชุบน้ำเกลือหรือน้ำยาบริเวณแผล หรืออาจใช้น้ำยาที่เป็นอย่างอื่น เช่น โซดาไบคาร์บอเนต หรือน้ำปูนใสก็ได้
 - ใช้น้ำแข็งประคบบริเวณแผล เพื่อระงับอาการปวดและช่วยลดการอักเสบของพิษ
 - ถ้าหากถูกต๋อยบริเวณหน้า คอ แล้วมีอาการบวมหายใจไม่ออก ให้รีบนำส่ง โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยด่วน

กรณีกระดูกหัก

ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ ประคองและจับส่วนที่บาดเจ็บอย่างมั่นคง อย่าพยายามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยไม่จำเป็น หรือจนกว่า

ส่วนของการกระดูกหักที่จะได้รับการเข้าเฝือกแล้ว

ใส่เฝือกชั่วคราว โดยใช้วัสดุที่หาง่าย เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง ไม้ไผ่ เป็นต้น (ถ้าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ เช่น กระดูกโคนขา อาจใช้ผ้าข้างดีเป็นตัวยึดก็ได้) และก่อน

เข้าเฝือก ควรใช้ผ้าสะอาดพันส่วนที่หักให้หนาพอสมควร หรือทำการห่มเลือดก่อน ถ้ามีเลือดออกมากพันน้ำยัดไม่ให้เคลื่อนไหว ระมัดระวังอย่าพันแน่นจนเกินควร เพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายไม่ได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ้าเป็นปลายแขน หรือมือ ใช้ผ้าคล้องคอ

ถ้ากระดูกหักโผล่ออกมานอกเนื้อ อย่าดันกลับเข้าที่เดิมเด็ดขาด เพราะจะทำให้เชื้อโรคและสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในแผลส่วนลึกได้ ให้หาผ้าสะอาดคลุม หรือปิดบาดแผลไว้ ให้น้ำกับปวดหากปวดแผลมาก เช่น พาราเซตามอล และห้ามผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

รับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บต้องทำอย่างระมัดระวัง โดยให้ส่วนที่หักเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

กรณีฉุกเฉิน

การปฐมพยาบาลและฉุกเฉิน ปฏิบัติได้ดังนี้

- รัดบริเวณเหนือแผลให้แน่นด้วยสายยาง เชือก หรือผ้าก็ได้ โดยรัดระหว่างแผลกับหัวใจ
- พยายามอย่าให้ผู้ป่วยหลับ
- ห้ามใช้ยากระตุ้นหัวใจเป็นอันตราย เพราะจะทำให้พิษเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้นรับนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที และสามารถบอกชนิดของงูที่กัดได้ก็จะยิ่งดี เพื่อสะดวกในการฉีดเซรุ่มแก้พิษ

ศูนย์ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย

“รวดเร็ว

อุ่นใจ

ปลอดภัยในบริการ”

ศูนย์ชีพ EMS 0-4312-1251 หรือ 1669 (โทรฟรี)

นายกเทศมนตรีฯ 08-7233-9396

ปลัดเทศบาลฯ 08-9571-1688

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 08-9942-4047

พนักงานชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1. นายนิยม ใต้ตา (หัวหน้าชุดฯ) โทร 08-7862-9510
2. นางสาวสมจิตร์ ญาณสิทธิ์ (จิตร) โทร 08-7224-1475
3. นายกำชัย มั่นดอนเรือ (ลู) โทร 09-6737-9193
4. นายประสงค์ สุนทรโรจน์ (แขก) โทร 09-6737-9177
5. นายสวัสดิ์ พระมาตย์ (หริส) โทร 09-9840-4966
6. นายชาติรี เกณส์สาธุ (ตรี) โทร 09-6736-1942
7. นายหมาย คำภาผุย (หมาย) โทร 09-8934-2644
8. นายณรงค์ ภูมูนา (เอ๊ะ) โทร 09-7124-0903
9. นายสมจิตร์ แสงคอนจิต (หมี) โทร 09-6926-3844

หลักยึดในการบริหารงาน พนักงานชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย

๑. ความมีวินัย คือสามารถควบคุมความประพฤติทางการกระทำ คำพูด ให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนร่วมกัน มาปฏิบัติตามตรงตรงเวลา รู้การให้เกียรติ การเคารพผู้บังคับบัญชา เชื่อฟังการสั่งการในอำนาจหน้าที่
๒. ความสามัคคี คือความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนในเรื่องไม่ถูกต้อง โดยมีความสามัคคีทั้งทางกายและทางใจ-
๓. ความสะอาด คือการทำงานและตนเองไม่สกปรก วางสิ่งของและอุปกรณ์ให้เป็นที่เป็นทาง ปิดกวาดเช็ดอยู่เป็นประจำ รวมถึงความสะอาดของร่างกายตนเองด้วย
๔. ความซื่อสัตย์ คือมีความประพฤติดี ยึดถือศีลธรรม ไม่พูดความเท็จ ไม่ลักขโมยของส่วนรวมหรือของคนอื่น มาทำงานเข้าผลัด และออกเวรให้ตรงเวลา แจ้งแต่ข้อเท็จจริงให้กับทางราชการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กรณีเป็นลมหรือหมดสติ

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้เป็นลม

- นำเข้าพักในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 - ให้นอนราบ และคลายเสื้อผ้าให้หลวม
 - ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก มือ และเท้า
 - ให้ผู้เป็นลมหรือหมดสติดื่มแอมโมเนีย
- ข้อสังเกต ถ้าใบหน้าผู้ที่เป็นลมขาวซีด ให้นอนศีรษะต่ำ
ถ้าใบหน้ามีสีแดง ให้นอนศีรษะสูง

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้หมดสติ

- ตรวจสอบในปากว่ามีสิ่งอุดต้นทางเดินหายใจหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบนำออกโดยเร็ว
- จัดให้ผู้หมดสติอยู่ในท่าที่เหมาะสม โดยให้ผู้หมดสติดูนอน ตะแคงคว่ำไปด้านใดด้านหนึ่ง
- คลายเครื่องนุ่งห่มให้หลวม และห้ามให้น้ำหรืออาหารทางปาก
- ถ้ามีอาการชักให้ใช้ ผ้าม้วนเป็นก้อนสอดระหว่างฟันบนกับฟันล่างเพื่อป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้นตนเอง
- ทำการห้ามเลือดในกรณีที่มีเลือดออก ถ้ามีอาการไม่ดีขึ้นให้นำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน